

彰化縣糖尿病尿液微量白蛋白篩檢流程

95 制定 101.05.29 修訂

流程	說明
<pre> graph TD     A([1. 篩檢前準備]) --&gt; B{2. 試紙篩檢}     B -- (-) --&gt; C[3. 第一次隨機尿液檢查]     B -- (+) --&gt; E[5. 留24小時尿液]     C --&gt; D4_1["4-1 A/C ratio &lt; 30µg/mg Cr A/C ratio 30-299µg/mg Cr"]     C --&gt; D4_2["4-2 A/C ratio ≥ 300µg/mg Cr"]     D4_1 --&gt; F[第二次隨機尿液檢查]     D4_2 --&gt; E     F --&gt; G["A/C ratio &lt; 30µg/mg Cr A/C ratio 30-299µg/mg Cr"]     F --&gt; H["A/C ratio ≥ 300µg/mg Cr"]     G --&gt; I[第三次隨機尿液檢查]     H --&gt; E     I --&gt; J["A/C ratio &lt; 30µg/mg Cr A/C ratio 30-299µg/mg Cr"]     I --&gt; K["A/C ratio ≥ 300µg/mg Cr"]     J --&gt; L([6-1. 每年定期篩檢一次])     K --&gt; M([6-2 腎臟病變])     </pre>	<p>1. 測量血壓及血糖等事項，排除影響檢驗疾病。</p> <p>2. 尿蛋白試紙篩檢： 若呈現陰性(-)，進行第一次隨機尿液檢查微量白蛋白；陽性(+)則需收集24小時尿液。</p> <p>3. 尿蛋白試紙篩檢呈現陰性(-)，收集第一次隨機尿液檢查微量白蛋白。</p> <p>4-1及4-2.隨機尿液檢查微量白蛋白結果呈現A/C ratio &lt; 30µg/mg Cr 或 A/C ratio 30-299µg/mg Cr；再進行第二次隨機尿液檢查微量白蛋白，若A/C ratio ≥ 300µg/mg Cr，則需收集24小時尿液。</p> <p>5. 留24小時尿液：留8AM至隔天8AM的尿液。</p> <p>6-1. 再次進行第三次隨機尿液檢查微量白蛋白，A/C ratio &lt; 30µg/mg Cr 或 A/C ratio 30-299µg/mg Cr，每年定期篩檢一次。</p> <p>6-2. 進行腎臟病照護：第1-3a期進行初期腎臟病照護；當GFR &lt; 45ml/min/1.73m<sup>2</sup> 第3b期時，應轉診Pre-ESRD醫療機構進一步評估治療。</p>